



Programfüzet

2019. november 29-30., Thermal Hotel Visegrád

**UPDATE** 2019

A SEMMELWEIS EGYETEM  
SZÜLÉSZETI ÉS  
NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA

**SZAKMAI TOVÁBBKÉPZŐ  
TANFOLYAMA**



## Probiotikus hüvelykapszula Lactobacillus Plantarum P 17630 VI

✓ **Hatásosan** előzi meg a reinfekciót<sup>1,2</sup>, állítja helyre a hüvelyflórát és enyhíti a tüneteket.



✓ **Jó túlélési képesség** megváltozott hőmérsékletű és pH-jú környezetben valamint antibiotikum jelenlétében.<sup>3</sup>

✓ **Jó adhéziós képesség** más Lactobacillus fajokhoz és a Candida albicanshoz képest.<sup>4,5</sup>

Egészségügyi szakemberek számára készült ismertetés.

A Canesflor probiotikus hüvelykapszula orvostechnikai eszköz, egyben gyógyászati segédeszköz.

Forgalmazza: Bayer Hungária Kft, 1123 Budapest, Alkotás u. 50. • L.HU.MKT.CC.02.10.2019.2090

1. Carriero C. és mtsai: Vaginal capsules of Lactobacillus plantarum P17630 for prevention of relapse of Candida vulvovaginitis *Int. Journal of Probiotics and Prebiotics*, Vol. 2, No. 2/3 p. 155-162. 2007
2. De Seta F. és mtsai: Lactobacillus plantarum P17630 for preventing Candida vaginitis recurrence; a retrospective comparative study, *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology* 182 (2014) 136-139
3. Dho G. és mtsai: Microbiological characteristics of Lactobacillus Plantarum P17630 contained in vaginal suppositories *GIMMOC Vol. VII N° 2*, 2003 102 – 108
4. Culici M. és mtsai: Adhesion of Lactobacillus plantarum P 17630 to Vaginal epithelial cells and its influence on Candida albicans adhesion, *GIMMOC Vol. VIII N° 1*, 2004
5. Bonetti A. és mtsai: Adherence of Lactobacillus plantarum P 17630 in soft-gel capsule formulation versus Döderlein's bacillus in tablet formulation to vaginal epithelial cells, *Minerva Ginecologica*, vol. 55. 2003

## Kedves Kollégánők és Kollégák!

Az eddigi rendezvények sikerére alapozva a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája idén ismét megrendezi kétnapos szakmai továbbképző tanfolyamát. Az idei rendezvényt 2019. november 29-én és 30-án tartjuk, Update 2019. címmel, a mindig kiváló háttérrel biztosító visegrádi Thermal Hotelben.

Az előadások megtartására a klinika munkatársai mellett az adott témakör vezető hazai szaktekintélyeit kérjük fel. A továbbképző tanfolyam során kifejezetten a gyakorló nőgyógyász mindennapi munkája során felmerülő kérdésekre koncentrálunk, az elmúlt év legfrissebb információit összefoglalva.

A Tanfolyam kreditpontos vizsgával zárul (32 kreditpont). A téli ünnepek előtti találkozással a szakmai továbbképzésen túl jó lehetőség adódik a szülészeti, nőgyógyászati aktuális kérdéseinek megbeszélésére, a kollégákkal történő kikapcsolódásra is. Azt reméljük, hogy a gyönyörű környezet ismét tökéletes helyszínt biztosít a tanfolyam megrendezéséhez, a magunk részéről mindent megteszünk a kiemelkedő szakmai és társasági program biztosítása érdekében.

**Prof. Dr. Ács Nándor**  
igazgató

**Prof. Dr. Bánhidó Ferenc**  
igazgató-helyettes

**UPDATE 2019 – Szervező Intézmény**



## Prémium támogatók



## Kiállítók



## Arany támogatók



## Ezüst támogatók





Making our world more productive



## LIVOPAN®

50% dinitrogén-oxid (N<sub>2</sub>O) és 50% oxigén (O<sub>2</sub>)

Biztonságos és hatékony  
fájdalomcsillapítás  
a vajúdás során

Nem csak fájdalomcsillapító, hanem  
feszültség oldó hatású is.

Nem korlátozza a mozgást a vajúdás folyamán.

Nem befolyásolja az APGAR értékeket.

Nem jár szövődmények fokozott kockázatával  
az újszülöttnél.

Linde Gáz Magyarország Zrt.  
Egészségügyi üzletág,  
1097 Budapest, Illatos út 11/a.  
Dr. Bencze Tünde;  
gáz terápia specialista  
Telefon: (30) 349-2237  
E-mail: tunde.bencze@linde.com

# SAMSUNG

Professzionális  
ultrahang-diagnosztikai  
készülékek

## BAJNOK CSAPAT

Újratöltve

v2.0

HERA W10

HS40

HS50/HS60



## Nálunk visszhangra talál

# SONARMED

Powered by SAMSUNG

Tel.: +36 (1) 203 75 81  
[www.sonarmed.hu](http://www.sonarmed.hu)

# ISOPRINOSINE®

## A HPV gyógyszeres kezelése

## Herpes genitalis kezelése

Rövidített alkalmazási előírás: Isoprinosine 500 mg tabletta, 500 mg inozin-acedoben-dimepranol tablettaként, Isoprinosine 50 mg/ml szirup, 50 mg inozin-acedoben-dimepranol 1ml szirupban (az adagolókanál 5 ml-es). Terápiás javallatok: Vírusfertőzések immunszupprimált betegeknél: herpes simplex, herpes zoster, varicella, morbilli, mumpsz, cytomegalo- és Epstein-Barr vírusfertőzések; Immunhiányos állapotok: Vírusos légúti infekciók; Condyloma acuminatum adjuváns terápia; Herpes simplex; Herpes zoster; Akut vírusos encephalitis (amit herpes simplex-, Epstein-Barr- és kanyaróvírus váltott ki); Bármely bőr vagy nyálkahártya (genitális, orális) érintettségű HPV-fertőzés; Virushepatitis; Szubakut szklerotizáló panencephalitis (SSPE). Adagolás és alkalmazás: Felnötteknek és időseknek: az ajánlott napi adag 50 mg/ttkg, legfeljebb napi 4 g-g (általában naponta 6-8 tabletta 3-4 adagra elosztva). Gyermkeknek: napi 50 mg/ttkg. A kezelés időtartama: akut megbetegedésekben: rövid lefolyású vírusos megbetegedésekben a kezelést a tünetek megszűnését követően még 1-2 napig, vagy tovább kell folytatni az orvos megítélése szerint. (A kezelés időtartama általában 5-14 nap.) Elhúzódó vírusos megbetegedésekben: a kezelést a tünetek megszűnését követően még 1-2 hétig vagy tovább kell alkalmazni az orvos megítélése szerint. Recidiváló esetekben: kezdetben az adag és a kezelés időtartama megegyezik az akut betegségben alkalmazottal. Ezt követően a tünetmentes betegnél csökkentett fenntartó dózis javasolt - amely felnőtteknél és időseknek napi 1-2 tabletta vagy 2-4 adagolókanál (10-20 ml) szirup - a recidív első tünetek megjelenéséig. Ekkor vissza kell térni az akut napi adagolásra, melyet a tünetek megszűnését követően még 1-2 napig szükséges folytatni, majd ismételt napi fenntartó adag alkalmazása javasolt. A beteg állapotának értékelése és a további kezelés szükségességének megállapítására irányuló rendszeres monitorozás mellett a kezelés szükség szerint ismételtető. Humán Papillomavírus okozta genitális fertőzések: külső genitális szemölcsök (kinéve a perianális, intraanális vagy meatusban lévő szemölcsöket), vagy az endocervix-szal összefüggő HPV-fertőzésekben napi 3 g (naponta 3x2 tabletta) a hagyományos helyi kezelés vagy sebészeti beavatkozás adjuváns terápiájaként 14-28 napig az alábbiak szerint: a) az "alacsony kockázatnak" kitett betegeknél a folyamatos 14-28 napos kezelést a maximális kiürülés elérése érdekében legfeljebb 2 hónapos gyógyszermentes időszak követi, b) a "magas kockázatnak" kitett betegeknél a maximális kiürülés elérése érdekében három hónapon át minden hónapon 1-2 egymást követő héten hetente 5 napig alkalmazható a készítmény. A beteg állapotának értékelése és a további kezelés szükségességének megállapítására irányuló rendszeres monitorozás mellett a kezelés szükség szerint ismételtető. Ellenjavallatok: a készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység; a betegnél aktuálisan zajló köszvényes roham; kórosan emelkedett szérum húgysavszint. Ez a gyógyszer szacharózt tartalmaz. Az Isoprinosine 50 mg/ml szirup egy adagja, amely meghaladja a 10 ml-t, több mint 5 g szacharózt tartalmaz. Ezt diabetes mellitusban szenvedő betegeknél figyelembe kell venni. Az Isoprinosine szirup metil- és propil-parahidroxibenzoátot tartalmaz, amely esetleg későbbiekben jelentkező allergiás reakciókat okozhat. Ez a gyógyszer nátriumot tartalmaz. Az Isoprinosine 50 mg/ml szirup egy adagja, amely meghaladja a 10 ml-t, több mint 1 mmol (23 mg) nátriumot tartalmaz, amit kontrollált nátrium diéta esetén figyelembe kell venni. Ez a készítmény kis mennyiségű - kevesebb mint 100 mg per adag - etanolt (alkohol) tartalmaz. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: a leggyakoribb mellékhatás, hogy a betegek egy részében a vizelet és a szérum húgysav koncentráció átmenetileg megemelkedik, de értéke általában a normál tartományon belül marad, és/vagy még a kezelés folyamán vagy legkésőbb a kezelés befejezése után néhány nappal visszatér a kiindulási értékre. Nagyon gyakori ( $\geq 1/10$ ) mellékhatások: a vér húgysavszintjének emelkedése, a vizelet húgysavszintjének emelkedése. Gyakori ( $\geq 1/100$  -  $<1/10$ ) mellékhatások: hányinger, hányás, epigastriális diszkomfort-érzés, tranzitumiditások, az alkalikus foszfatáz vagy a vér karbamidnitrogén (BUN) szintjének emelkedése, bőrpírítás, viszketés, fejfájás, szédülés, fáradtságérzés, rossz közérzet, izületi fájdalom. Az alkalmazási előírások dátuma, tabletták: 2019.02.09. szirup: 2019.02.09. Isoprinosine 500 mg tabletta: bruttó forgalmazási ár: 4.298,- Ft. Férfitési ár: 3.222,- Ft. TB támogatás: normatív, 25%. A TB támogatás mértéke: 1075 Ft. OGIU-eng. száma: OGIU-13687/01. Isoprinosine 50 mg/ml szirup: ajánlott bruttó forgalmazási ár: 4.093,- Ft. TB támogatás: nincs. OGIU-eng. száma: OGIU-T-8676/03. Az aktuális árakról kérjük tájékozódjon a [www.neak.gov.hu](http://www.neak.gov.hu) oldalon. Rendeltettség: kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek (V). Kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírásokat! A dokumentum lezárásának ideje: 2019.11.13. Amennyiben gyógyszerreinkkel kapcsolatosan mellékhatás lépne fel, kérjük, késelem nélkül az alábbi e-mail címen jelezze be: [pharmacovigilance@ewopharma.hu](mailto:pharmacovigilance@ewopharma.hu). Referenciák: 1. Bede O. et al. ERS Congress 2010 Barcelona E-2471 2. Santangelo G. et al. Agg. Ped. 1981;32:1-24 3. Galli M. et al. Immunomodulation: New Frontiers and Advances: New York, Plenum Press, 1984 4. Ragot JP. et al. Actualites Odontostomatologiques. 1986;154:233-248 5. Geiger SA. et al. Der informierte Arzt. 1985;13(2): 30-35 Forgalmazó hozzájárulást engedélyvel jogosultja: Ewopharma International, s.r.o. Prokopa Veľkého 52 811 04 Bratislava Szlovákia

## Tudományos program

NOVEMBER 29., PÉNTEK

09:15-09:30 MEGNYITÓ

Prof. Dr. Ács Nándor, igazgató

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

09:30-11:15 ELŐADÁSOK I.

Üléselnök: Dr. Szabó István

### A Streptococcus B, A infectio jelentősége

Dr. Melczer Zsolt

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

### A császármetszés jogi vonatkozásai

Dr. Keresztúri Attila

Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

### Alternatív szülészeti

Dr. Ádám Zsolt

Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

### Laparoscopes műtéstechnikai alapok

Dr. Lampé Rudolf

Debreceni Egyetem KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debrecen

### A méheltávolítás gyakorlatának változása az elmúlt években. Merre tovább?

Prof. Dr. Németh Gábor

Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Szeged

### Sentinel-nyirokcsomók jelentősége a nőgyógyászatban

Dr. Lintner Balázs

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

### 15 perc vita

### 11:15-11:30 KÁVÉSZÜNET



Bővebb információért olvassa el a gyógyszerek alkalmazási előírását!



**ALTFORALLE 3 mg/0,02 mg**  
filmtabletta alkalmazási előírása:  
[https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show\\_details&item=30839](https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=30839)



**DITINELL 0,06 mg/0,015 mg**  
filmtabletta alkalmazási előírása:  
[https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show\\_details&item=97152](https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=97152)



**ALTFORALLE 3 mg/0,03 mg**  
filmtabletta alkalmazási előírása:  
[https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show\\_details&item=30840](https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=30840)



**OMISSON DAILY 2 mg/0,03 mg**  
filmtabletta alkalmazási előírása:  
[https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show\\_details&item=76227](https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis?action=show_details&item=76227)

Az Altforalle 3 mg/0,02 mg 1x28 és 3x28 filmtabletta, az Altforalle 3 mg/0,03 mg 1x28 és 3x28 filmtabletta, a Ditinell 0,06 mg/0,015 mg 1x28 és 3x28 filmtabletta, valamint az Omisson Daily 2 mg/0,03 mg 3x28 filmtabletta támogatásban nem részesülő, szabadáras készítmények.

Termékeink árvidtolódsával és rendelkezésével kapcsolatos információkért forduljon orvoslátogató kollégáinkhoz, illetve ezekről tájékozódhat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján: [www.neak.gov.hu](http://www.neak.gov.hu).

GYN20

További információk: Egis Gyógyszergyár Zrt. Specialista Üzletág, 1134 Budapest, Lehel u. 15.,  
tel.: 06-1-803-2222, e-mail: [marketing@egis.hu](mailto:marketing@egis.hu), honlap: [hu.egis.health](http://hu.egis.health)  
Lezárás dátuma: 2019. 11. 13.

**MB** | MAGYAR  
BRANDS  
2018



## 11:30-13:00 ELŐADÁSOK II.

Üléselnök: Prof. Dr. Ács Nándor

### Szexualitás várandósság és gyermekágy idején

Prof. Dr. Pajor Attila

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

### Az endometrioticus cysta műtéti ellátása - cystectomy/fenestratio?

Dr. Bokor Attila

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

### A primer császármetszés frekvencia csökkentésének lehetőségei

Prof. Dr. Sziller István

Szent Imre Egyetemi Oktató Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

### Az adenomyosis diagnosztikája és terápiája

Dr. Szabó István

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

### Jódopótlás várandósság során

Dr. László Dániel

Péterfy Sándor utcai Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

### 15 perc vita

### 13:00-14:00 EBÉDSZÜNET





# Neo-Ferro-Folgamma

114 mg / 0,8 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

**Helyes adagolás, elégedett beteg**  
Egyidejű vas- és folsavhiányos anaemiák megelőzése és kezelése a terhesség alatt.

Tbl. Neo-Ferro-Folgamma 100x  
Scat. orig. No. I. (unam)  
  
D.S.: kezelésre: 3 X 1  
D.S.: megelőzésre: 1 X 1  
  
Javasolt terápia 4 hónap.

## Neo-Ferro-Folgamma 114 mg / 0,8 mg gyomornedv-ellenálló tabletta

| Kiszámlálás | Bruttó<br>fogyasztói ár (Ft) | Normatív támogatási<br>kategória (%) | Normatív támogatási<br>összeg (Ft) | Térítési díj normatív<br>támogatás esetén (Ft) |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| 50x         | 1114                         | 25                                   | 187                                | 927                                            |
| 100x        | 2148                         | 25                                   | 374                                | 1774                                           |

**Adagolás és alkalmazás:** Felnőttek, az időseket is beleértve: Egyidejű vas és folsavhiányos anaemiák kezelésére: 3x1-2 gyomornedv-ellenálló tabletta naponta. Terhes nők: Egyidejű vas és folsavhiányos anaemiák megelőzésére: 1 gyomornedv-ellenálló tabletta naponta egyszer. Egyidejű vas és folsavhiányos anaemiák kezelésére: 3x1 gyomornedv-ellenálló tabletta naponta. Gyermek és serdülő: Egyidejű vas és folsavhiányos anaemiák kezelésére: 12 év alatti gyermekek kezelésére ez a gyógyszer nem ajánlott! 12 éves kor feletti gyermekeknek és serdülőknek: 3x1-2 gyomornedv-ellenálló tabletta naponta. A tablettákat nem szabad szopogatni, szétrágni vagy a szájban tartani, hanem egészben, vízzel kell azokat lenyelni. A tablettákat a gasztrointesztinális tolerancia függvényében étkezések előtt vagy közben kell bevenni. A kezelés időtartamát egyénileg, a vasanyagcsere állapotának (rendszeres laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrizve) megfelelően kell meghatározni. A gyógyszer adagolását nem szabad a haemoglobin koncentráció normalizálódása után abbahagyni, hanem folytatni kell a vasraktárak feltöltéséig (kb. három hónap). A folsavhiányos anaemia kezelése körülbelül négy hónapot igényel. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagaival, vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Nem vashiány kiváltotta anaemiák, hacsak nem áll fenn vashiány is. Önmagában vagy nem megfelelő mennyiségű B<sub>12</sub>-vitamin alkalmazása nélkül tisztázatlan eredetű megaloblastos anaemia kezelésére. Önmagában anaemia perniciosa és egyéb, B<sub>12</sub> vitaminhiány következtében kialakult megaloblastos anaemia esetén. Ismételt transzfúzióban részesült betegeknek. Orális vaskészítmények adása kontraindikált, ha egyidejűleg parenterális vasterápiát is alkalmaznak. Dimerkaprol (dimerkapto-propanol) kezelés. A kezelés megkezdése előtt az anaemia típusát meg kell határozni. Az anaemia kezelése akkor kezdhető meg, ha a vashiány és folsavhiány igazolt. A hiányállapot hátterében álló okokat fel kell kutatni, és kezelni kell. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** Emésztőrendszeri betegségek és tünetek: Nagyon gyakori: a széklet sötétebbé színeződik, amelynek nincs jelentősége. Gyakori: étvágytalanság, teltségérzet, gastrointesztinális irritáció, gyomorégés, eructatio, hasi fájdalom vagy diszkomfort érzés a gyomorban, hányinger, hányás, diarrhoea illetve obstipatio. **Felhasználhatósági időtartam:** 4 év. **Megjegyzés:** \* (egy kereszt). **Oszályozás:** II. csoport. **Készítmény orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). A forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Wörwag Pharma GmbH & Co. KG Calwer Str. 7, D-71034 Böblingen Németország. **A forgalomba hozatali engedély első kiadásának / megújításának dátuma:** 2006. december 6. / 2011. szeptember 29. A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2018. május 9. **Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!**

NFFGGyn\_Update pfhirdA5.2019.11.13. lezárás dátuma: 2019.11.13



**WÖRWAG PHARMA KFT.**  
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.  
Tel.: (1) 345-7350 Fax: (1) 345-7353



info@woerwagpharma.hu  
www.woerwagpharma.hu

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja  
2010 - 2020



## 14:00-15:30 ELŐADÁSOK III.

Üléselnök: Prof. Dr. Bánhidó Ferenc

### Hitek és tévhitek II.

Prof. Dr. László Ádám

Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

### A női obezitás endokrinológiai következményei

Prof. Dr. Takács István

Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

### Premenstrualis szindróma - perinatalis szövődmények

Dr. Erős Erika

Jól-lét és Egészség Klinika, Budapest

### Episiotomia pro/kontra

Prof. Dr. Ács Nándor

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

### Kolposzkópia: szűrés, vagy 2. lépés?

Dr. Pap Károly

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Nyíregyháza

## 15 perc vita

## 15:30-15:45 KÁVÉSZÜNET

# HAEMOCOMPLETTAN® P

humán fibrinogén koncentrátum



Egy vesetálynyi vér  
(500ml) elvesztése  
már PPH-t jelezhet  
hüvelyi szülésnél! (1)

**Időben adjon Haemocomplettan-t PPH-ban!**  
**Csökkentse a hysterectomy kockázatát! (2)**

PPH: postpartum vérzés

**Haemocomplettan P 20 mg/ml** por oldatos injekcióhoz vagy infúzióhoz. A Haemocomplettan P 1 g vagy 2 g fibrinogén tartalmaz üvegenként. **Terápiás javallatok:** Haemorrhagiás diathesis kezelésére és megelőzésére, veleszületett hypo-, dys- vagy afibrinogenaemiában; az alábbiak következtében kialakult (szerzett) hypofibrinogenaemiában: a szinézis károsodása a májparenchyma súlyos rendellenessége esetén, fokozott intravasculáris felhasználás, pl. disseminált intravasculáris coagulatio következményeként, hyperfibrinolysis, fokozott vértúrtólulás. **Adagolás és alkalmazás:** A kezelést az alvadási rendellenességek kezelésében jártas szakorvos felügyelete mellett szabad elkezdni. A szubsztitúciós kezelés dózisa és időtartama a vérárvadási zavar súlyosságától, a vérzés helyétől és kiterjedésétől, valamint a beteg klinikai állapotától függ. Fibrinogén adag (mg/ttkg) = Elérendő szint (g/l) – mért szint (g/l) / 0.017 (g/l / mg/ttkg) Intravénás infúzió vagy injekció formájában. Az adagolás sebessége ne legyen nagyobb, mint 5 ml/perc. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával vagy a 6.1 pontban felsorolt bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység, nyilvánvaló thrombosis, myocardialis infarctus, kivéve a potenciálisan halálos vérszűkítést. **Különleges figyelmeztetések:** Ha allergias vagy anaphylaxis reakciók jelennek meg, az injekciót/infúziót azonnal meg kell szakítani. Anaphylaxis shock esetén a shock kezelésére vonatkozó szerszert irányelveket kell követni. Mellékhatások: Nem gyakran allergias vagy anaphylaxis típusú reakciókat észleltek. Az allergias/anaphylaxis reakciókhoz kapcsolódva előfordult: generalizált urticaria, bőrkötés, légszomj, szapora szívverés, élmelygés, hányás, hidegrázás, láz, mellkasi fájdalom, köhögés, vérnyomáscsökkenés és anaphylaxis shock.

| Mellékhatások                       | FCH (N= 107) | Placebo (N= 106) |
|-------------------------------------|--------------|------------------|
| Láz                                 | 11 (10,4%)   | 5 (4,7%)         |
| Thromboembolias események           | 8 (7,4%)     | 11 (10,4%)       |
| Allergiás vagy anaphylaxis reakciók | 1 (0,9%)     | 0                |

**Farmakodinámiai tulajdonságok:** vérzéscsökkentő szer, humán fibrinogén ATC kód: B02B B01

**Felhasználhatósági időtartam:** 5 év. Az elkészített oldat kémiai és fizikai stabilitása 25°C-on 8 órán át igazolt. Hűtőszekrényben tárolandó (2-8 Celsius fok). Nem fagyasztható. **Megjegyzés:** \* (egy keresztet). Összetétel: 1/3, Csoport. **A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA:** CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-str. 76, 35041 Marburg, Németország. ÖGY-T-6363/01. ÖGY-T-6363/02. 2019. június 26. **Haemocomplettan 1g-os ár:** szabaddas készítmény. **Haemocomplettan 2g-os ár:** szabaddas készítmény. AEEK által közbeszerzett készítmény.

**Referencia:** 1. Póka R. Újabb iránymutató a masszív szülészeti vérzések megelőzésében és kezelésében. Aneszteziológia és intenzív terápia 45.évf. 1.sz., 2015  
2. S. Mallai et al. Introduction of an algorithm for ROTEM-guided fibrinogen concentrate administration in major obstetric haemorrhage. Anaesthesia 2015, 70, 166–175  
doi:10.1111/anae.12859

Kód: HUHCOMPHADV/201904/172 Lezárás: 2019.04.23.

**CSL Behring**  
Biotherapies for Life™

www.cslobehring.com  
CSL Behring Kft. 1123-Hungary, Budapest  
Alkotás u. 53. D. ép. 4. em. MOM Park  
Tel.: +36 1 213 4290, Fax: +36 1 213 4298

**15:45-17:15 ELŐADÁSOK IV.**

Üléselnök: Dr. Melczer Zsolt

**Pulmonológiai betegségek szülészet-nőgyógyászati vonatkozásai**

Prof. Dr. Müller Veronika

Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika, Budapest

**Thrombosis prophylaxis, LMWH igény az ESA guideline alapján**

Prof. Dr. Gál János

Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest

**Az ERAS lehetőségei a szülészet-nőgyógyászatban**

Dr. Hupuczi Petronella

Maternity Szülészeti Magánklinika, Budapest

**Cervix insufficiencia**

Prof. Dr. Koppán Miklós

Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Pécs

**15 perc vita**



Az eredményes tesztelés legyen a cél.  
A verifi tesztnél az eredménytelenség esélye...  
...mindössze 1 ezrelék!

## Az **illumina** nem-invazív prenatalis tesztje (NIPT)



**verifi**<sup>®</sup>  
prenatal test

Eredmény általában 6 munkanapon belül.

[www.verifi-teszt.hu](http://www.verifi-teszt.hu)

## Tudományos program

NOVEMBER 30., SZOMBAT

09:00-10:30 **ELŐADÁSOK V.**

Üléselnök: Prof. Dr. Paulin Ferenc

**A méhen belüli magzati retardáció felismerése – hazai és nemzetközi percentilis táblázatok összehasonlítása**

Dr. Benkő Zsófia

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

**Kérdések a köldökzsinór ellátás körül**

Dr. Szabó Miklós

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

**A császármetszés indikációjának értékelése a Tauffer-adatbázis alapján**

Dr. Csákány György

Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Budapest

**Szívfejlődési rendellenességek műtéti ellátási lehetőségei**

Dr. Prodán Zsolt

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Csecsemő- és Gyermekszívsebészeti Osztály, Budapest

**A megelőzhető koraszülések**

Dr. Valent Sándor

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

**15 perc vita**

**10:30-10:45 KÁVÉSZÜNET**

## 10:45-12:15 ELŐADÁSOK VI.

Üléselnök: Prof. Dr. Bánhidó Ferenc

### Nőgyógyászati tumorok 5 éves túlélésének változásai Magyarországon

Dr. Máté Szabolcs

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

### “Aktualitások a férfiegészség területén” - amit a nőgyógyásznak is hasznos tudni

Dr. Fekete Ferenc

Potencia Klinika, Budapest

### A vérigény csökkentésének lehetőségei a szüléset-nőgyógyászatban

Prof. Dr. Babik Barna

Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Szeged

### Szívbeteg várandósok ellátása kardiológus szemmel

Prof. Dr. Merkely Béla

Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika, Budapest

### Korai újszülöttkori fertőzés - fókuszban a GBS

Dr. Nádor Csaba

Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest

### 12:15 Zárszó

Prof. Dr. Ács Nándor

## Általános információ

### A TANFOLYAM HELYSZÍNE

Thermal Hotel Visegrád

2025 Visegrád, Lepence-völgy

### SZERVEZŐ IRODA

CongressLine Kft.

1065 Budapest, Révay köz 2.

Tel: (1) 429 0146, Fax: (1) 429 0147

<https://update2019.congressline.hu>

### KIÁLLÍTÁS, SZPONSZORÁCIÓ

Papp-Vid Melinda

Tel: (1) 429 0146, (1) 312 1582

E-mail: [pappvid@congressline.hu](mailto:pappvid@congressline.hu)

### REGISZTRÁCIÓ ÉS SZÁLLÁSFOGLALÁS

Gaitz Éva

Tel: (1) 429 0146, (1) 312 1582

E-mail: [gaitz@congressline.hu](mailto:gaitz@congressline.hu)

## Regisztráció

|                                          | 2019. október 11. előtt | 2019. október 12. után |
|------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Résztevő                                 | 35.000 Ft               | 40.000 Ft              |
| Rezidens, szakorvos jelölt (igazolással) | 25.000 Ft               | 25.000 Ft              |
| Kísérő                                   | 25.000 Ft               | 30.000 Ft              |

A részvételi díjak 27 % Áfa-t és 7.450,- Ft/fő/nap közvetített vendéglátói szolgáltatást tartalmaznak.

**A részvételi díj tartalmazza** a rendezvényen való részvételt, a tanfolyam kiadványait, a kiállítás megtekintését és az ebédeket.

**A kísérői részvételi díj tartalmazza** a pénteki és a szombati ebédet, valamint a részvételt a társasági programon (a tanfolyam tudományos programja és kiállítása ezzel a belépővel nem látogatható).

### JELENTKEZÉS

**2019. november 15. után**, a Szervező iroda csak a szabad kapacitás függvényében fogad regisztrációt. **Helyszíni regisztráció nem lehetséges!**

### REGISZTRÁCIÓS IRODA NYITVA TARTÁSA A TANFOLYAM IDEJE ALATT

**2019. november 29., péntek** 08:00 – 18:00

**2019. november 30., szombat** 08:00 – 12:00

#### KREDIT PONT

A tanfolyam akkreditálásra került ( SE-TK/2019.II/00271), a résztvevők 32 kreditpontot szerezhettek.

#### TÁRSASÁGI PROGRAM

**2019. november 29., péntek, 20:00 óra**

Vacsora a Thermal Hotel Visegrádban  
(fakultatív, 10.000,-Ft/fő)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a társasági programon csak kitűzővel és meghívóval lehet részt venni! Vacsora jegy csak érvényes regisztráció mellett váltható. Helyszínen jegyvásárlás és fizetés nem lehetséges, kérjük vacsora költségét előre átutalással rendezze:

**Bankszámla szám:** K&H Bank 10404027-50504851-52551004  
(közleményként, kérjük a résztvevő nevét feltüntetni)

**A VACSORA MIATT, PÉNTEK ESTE A THERMAL HOTEL VISEGRÁD EGYÉNI ÉTKEZÉSI IGÉNYEKET NEM TUD FOGADNI (pl. szobaszervíz)!**

#### EBÉD

A tanfolyam ebédszünetében a Thermal Hotel Visegrád éttermében szűkített svédasztalos ebédet biztosítunk november 30-án és december 1-jén.

## Szálláshelyek

#### SZÁLLODÁK

**Thermal Hotel Visegrád**

(a tanfolyam helyszíne)  
2025 Visegrád, Lepence-völgy

**Royal Club Hotel**

2025 Visegrád, Fő utca 92.

**Visegrád Hotel**

2025 Visegrád, Rév u. 15.

**Patak Park Hotel**

2025 Visegrád, Mátyás király utca 92-94.

**Silvanus Hotel**

2025 Visegrád, Feketehegy

#### LEMONDÁSI FELTÉTELEK

**2019. október 26. előtt** a részvételi díj 80%-át, a szálláselőleg és a fakultatív program egészét visszafizetjük. A megadott határidő után nem áll módunkban a részvételi díjat, a szálláselőleget és a fakultatív program díját visszatéríteni.

#### PARKOLÁS

Ingyenes a Thermal Hotel Visegrád parkolójában. A Hotel közvetlen parkolójában, elsősorban a helyben lakó vendégek parkolását tudjuk biztosítani. **Kérjük a többi szállodában elhelyezett résztvevőket, hogy a szállodával szemben, a duna parti parkolót vegyék igénybe.**





## Busztranszfer

2019. NOVEMBER 29., PÉNTEK

| Indulás                                                 | Honnan                                         | Hova                                                                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 14:00-17:00 – 1/2 óránként                              | Thermal Hotel Visegrád<br>(tanfolyam helyszín) | Silvanus Hotel<br>Patak Park Hotel<br>Visegrád Hotel<br>Royal Club Hotel |
| 14:00-17:00 – 1/2 óránként                              | Silvanus Hotel                                 | Thermal Hotel Visegrád                                                   |
| Kérjük a többi szállodából telefonon jelezzék az igényt |                                                |                                                                          |
| 17:30-18:00 – igény szerint                             | Thermal Hotel Visegrád<br>(tanfolyam helyszín) | Silvanus Hotel<br>Patak Park Hotel<br>Visegrád Hotel<br>Royal Club Hotel |
| 19:30                                                   | Silvanus Hotel                                 | Thermal Hotel Visegrád                                                   |
| 19:30                                                   | Patak Park Hotel<br>Visegrád Hotel             | Thermal Hotel Visegrád                                                   |
| Kérjük a többi szállodából telefonon jelezzék az igényt |                                                |                                                                          |
| 22:00-24:00 – 1/2 óránként                              | Thermal Hotel Visegrád                         | Silvanus Hotel<br>Patak Park Hotel<br>Visegrád Hotel<br>Royal Club Hotel |

2019. NOVEMBER 30., SZOMBAT

| Indulás | Honnan           | Hova                   |
|---------|------------------|------------------------|
| 09:00   | Silvanus Hotel   | Thermal Hotel Visegrád |
| 09:10   | Patak Park Hotel | Thermal Hotel Visegrád |

Telefonos egyeztetés a következő telefonszámon: 06 70 608 68 06

## Térkép



Jegyzet

Lined area for notes on page 24.

Jegyzet

Lined area for notes on page 25.

## Kiállítói alaprajz


### THERMAL HOTEL VISEGRÁD

#### Konferencia szint (-1)

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Istenghegyi Géndiagnosztika   | 1  |
| Sonarmed                      | 2  |
| Reposys Termékenységi Központ | 3  |
| Richter Gedeon                | 4  |
| Maternity Magánklinika        | 5  |
| Premed Pharma                 | 6  |
| EGIS Gyógyszergyár            | 7  |
| Linde Gáz                     | 8  |
| P&G Hungary                   | 9  |
| Bayer                         | 10 |
| Mediner                       | 11 |
| Wörwag Pharma                 | 12 |
| Q Pharma                      | 13 |
| Novelmedix                    | 14 |
| Roche Magyarország            | 15 |
| Unicorp Biotech               | 16 |
| Sanadis Hungária              | 17 |
| Med-En Trade                  | 18 |
| CSL Behring                   | 19 |
| Exeltis Magyarország          | 20 |
| Foglalj Orvost                | 21 |
| Ewopharma Hungary             | 22 |
| Gyno-Cont                     | 23 |
| Phytotec Hungária             | 24 |
| Bausch Health                 | 25 |
| Adexilis Hungary              | 26 |
| Bluemed                       | 27 |
| Hipp                          | 28 |
| Leo Pharma                    | 29 |
| Angelini Pharma               | 30 |
| Vitaminkosár                  | 31 |
| Astellas Pharma               | 32 |

#### Földszint (0)

|            |    |
|------------|----|
| PrenaTest® | 33 |
| BABYBOX    | 34 |



# Az új Femibion család

## FEMIBION 1: ÚJ ÖSSZETÉTEL

Az első várandósvitamin  
kolinnal és Metafolin®-nal

## FEMIBION 2: ÚJ ÖSSZETÉTEL

A gondosan válogatott összetevők mellett  
már luteint is tartalmaz. DHA tartalma  
hozzájárul a magzat agyának és szemének  
normál fejlődéséhez.<sup>1</sup>

## FEMIBION 3: ÚJ TERMÉK

Gondosan válogatott tápanyagokat tartalmaz,  
mint például a DHA, kolin, A-vitamin,  
melyek támogatják a szoptató  
anyák megnövekedett tápanyagigényét.<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup> A BIZOTTSÁG 440/2011/EU RENDELETE:

Az anyai DHA bevitel hozzájárul a magzat és az anyatejfel-  
táplált csecsemő agyának és szemének normál fejlődéséhez.  
A kedvező hatás eléréséhez a várandós és szoptató anyáknak  
az omega-3-zsírsavakból a felnőttek számára ajánlott  
naponta 250 mg DHA és EPA felül  
további 200 mg DHA-t kell naponta fogyasztaniuk.

<sup>2</sup> EFSA Journal 2016;14(8):4484.

<sup>3</sup> EFSA Journal 2015;13(3):4028

A Femibion termékek étrend-kiegészítők, melyek nem helyettesítik  
a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.  
P&G Hungary Kkt. • 1082 Budapest, Kisfaludy u. 38. Tel.: +36-1-451-1301  
www.femibion.hu • MAT-HU-FM-19-000002





# LACTINELLE

Hüvelyi probiotikum a hüvelyflóra egyensúlyáért!



## LACTINELLE

kemény hüvelykapszula

Különböző eredetű, intenzitású hüvelyfertőzések megelőzésére és kezelésére alkalmazható természetes készítmény.

10 db

## LACTINELLE

kemény hüvelykapszula

*Lactobacillus gasseri*  
*Lactobacillus rhamnosus*

mediner

**Ez a tájékoztató anyag orvosok és gyógyszerészek számára készült.** Az egyes betétek elérhetők a forgalmazó által javasolt ártól. Kérjük, minden esetben tájékozódjon az adott patikában alkalmazott fogasztói árról. A Mediner Kft. nem vállal felelősséget a közzétett információk illetéktelen felhasználásából eredő következményekért!

### Rövidített alkalmazási előírás - Lactinelle kemény hüvelykapszula

**1. Hatóanyag:** 1 kemény hüvelykapszula tartalma: élő tejsavbaktériumok: *Lactobacillus gasseri*: Minimum 100 millió élő tejsavbaktérium • *Lactobacillus rhamnosus*: Minimum 100 millió élő tejsavbaktérium **2. Terápiás javaslatok:** • A bakteriális vaginosis antibiotikus kezelése során, kiegészítő kezelésként, a hüvely mikroflóra egyensúlyának visszaállítására • A Lactinelle hüvelykapszula a normál hüvelyi mikroflóra fenntartásával véd a visszatérő hüvelyi fertőzések ellen. **3. Ellenjavallatok:** Tejsavbaktériumok (Lactobacillus gasseri, Lactobacillus rhamnosus) vagy a készítmény bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. **Figyelmeztetések:** • A beteg figyelmeztet fel kell hívni arra, hogy amennyiben tünetei egy héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak, keresse fel kezelőorvosát. **4. Adagolás és alkalmazás:** Felelősek és 12 évesnél idősebb gyermekek és serdülők • Kiegészítő, kiegészítő antibiotikus kezelést követően: Esténként lefekvés előtt 1 hüvelykapszula felhelyezése a hüvelybe 6-8 napon át. • Megelőzés, fenntartó kezelés közvetlenül a menstruációs ciklus végét követően: Esténként lefekvés előtt 1 hüvelykapszula felhelyezése mélyen a hüvelybe 4-6 napon át. A kapszult egy ujjal a lehető legmélyebbre kell a hüvelybe felhelyezni. A kapszula hüvelybe való felhelyezése előtt alaposan kezelt kell mosni. **Gyermekek:** A Lactinelle alkalmazása 12 évesnél fiatalabb gyermekek esetén nem ajánlott. **5. Mellékhatások:** Nem észlelt panasz a készítmény alkalmazása során jelentkező nem kívánt hatásokról, illetve mellékhatásokról. **Felhívás mellékhatás bejelentésére:** Kérjük, hogy bármely gyógyszerrel kapcsolatos feltételezett mellékhatást jelentsen a forgalomba hozatali engedély jogosultjának gyógyszerbiztonsági ügyekért felelős partnerének – RAD-MED-PHARMA Kft., 1119 Budapest, Andor utca 24. C. hat. 7., tel.: +36-30-921-9016, fax: +36-1-2000269, fax: +36-1-208-1625, e-mail: radmedpharma@radmedpharma.hu – vagy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) a [www.ogyei.gov.hu](http://www.ogyei.gov.hu) honlapon megtalálható online bejelentő-felületen keresztül, vagy a honlapon látható mellékhatás-bejelentő lapot, melyet visszatérítendő e-mailben ([adr.bor@ogyei.gov.hu](mailto:adr.bor@ogyei.gov.hu), levélben (OGYÉI), 1372 Postafiók 4501, vagy faxon (1/896-9472). Kérjük, bejelentésért a fenti elérhetőségek közül csak az egyike költse el. **6. A készítmény felhasználásával/kezelésével kapcsolatos információk:**

A megismerésére vonatkozóan nincsenek különleges előírások. Megjegyzés: kereskedelmi névelő **Dzsetty** (Dzsetty) csoport. Orvosi rendelvény nélkül is kapható gyógyszer (VN). **7. A forgalomba hozatali engedély jogosultja:** Mediner Kft., 4025 Debrecen, Mihály utca 16. I. em. 1. E. +352335708-08; [info@mediner.hu](mailto:info@mediner.hu)

**8. A forgalomba hozatali engedély száma:** OGYI-T-22194/01-B • OGYI-T-22194/02-10 •

Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását.

Létrejött dátuma: 2019.11.05. LACI/UPDATE/201911\_06/MOR

mediner